

病名 : 進行・再発子宮頸癌

レジメンセット名 : パムフロキサマフ+TC+BEV

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 PDまで コース

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 (アフリキサト併用)パムフロキサマフ+TC+BEV ルートキープ用 大塚生食注 50mL	1 本	5~10分	時間未定
	2	DIV 点滴注射 インラインフィルターを使用 大塚生食注 100mL キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V 200mg/body	1 本 200 mg /Body	30分	時間未定
	3	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL	1 本	10~20分	時間未定
	4	DIV 点滴注射 パロキサトン点滴静注パックス0.75mg/50mL (アロキシ) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先デキサート) アフリキサト併用→デキサート減量	1 本 1.5 V	15分で	時間未定
	5	DIV 点滴注射 ファモチジン注射用 20mg/A(前カモファー) ポラミン注 5mg/1mL/A 大塚生食注 50mL	1 A 1 A 1 本	15分で	時間未定
	6	DIV 点滴注射 ハクリキセル注「ホスピーラ」 30mg/5mL/V(タキソール) 175mg/m2 ブドウ糖液(テルモ糖注) 5% 500mL	175 mg /m ² 1 本	3時間で	時間未定
	7	DIV 点滴注射 AUC=5 カルボプラチン注「NK」 450mg/45mL/V 大塚生食注 250mL	5 mg /GFR+25 1 本	1時間で	時間未定
	8	DIV 点滴注射 アバチン点滴静注用 400mg/16mL/V 15mg/kg 大塚生食注 100mL 初回90分、2回目60分、3回目~30分	15 mg /kg 1 本	90分→60分→ 30分	時間未定
	9	DIV 点滴注射 ルートフラッシュ 大塚生食注 50mL	1 本	全開で	時間未定
処方 コメント					