

病名 : 進行・再発子宮頸癌

レジメンセット名 : ヘムフロリスマブ+TP

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 6 コース

キイトルーダはPDまで

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 (アフリビタ含有)ヘムフロリスマブ+TP ソルアセトD輸液 500mL(先:ウーイーンD)	1本	2時間で	時間未定
	2	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL	1本	5~10分	時間未定
	3	DIV 点滴注射 大塚生食注 100mL キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V 200mg/body	1本 200 mg /Body	30分	時間未定
	4	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL	1本	10~20分	時間未定
	5	DIV 点滴注射 パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL (アロキン) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1本 1.5 V	15分	時間未定
	6	DIV 点滴注射 ファモチジン注射用 20mg/A(前カモファー) ポララミン注 5mg/1mL/A 大塚生食注 50mL	1 A 1 A 1本	15分	時間未定
	7	DIV 点滴注射 175mg/m ² パクリタキセル注(ホスピール) 30mg/5mL/V(タキソール) ブドウ糖液(テルモ糖注) 5% 500mL	175 mg /m ² 1本	3時間で	時間未定
	8	DIV 点滴注射 50mg/m ² 全量で500mLに調製 シスプラチン注「日医工」10mg/20mL/V テルモ生食注 500mL	50 mg /m ² 1本	2時間で	時間未定
	9	IV 静脈内注射 ラシックス注 20mg/2mL/A	1 A	シスプラチン開始 後IV.	時間未定
	10	DIV 点滴注射 ポタコールR輸液 500mL	1本		時間未定
	11	DIV 点滴注射 ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタT3)	1本		時間未定
	12	DIV 点滴注射 翌朝まで持続 ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタT3)	1本		時間未定