

病名 : 進行再発の卵巣がん

レジメンセット名 : ドキシル+CBDCA+BEV(Day1)

1コース期間(休薬期間含む) 日 上限 コース

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV 点滴注射 ドキシル+CBDCA+BEV(Day1) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1 V	30分で	時間未定
	パロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL (アロキソ)	1 本		
2	DIV 点滴注射 ドキシル前にルートフラッシュ ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL	1 本	全開で	時間未定
3	DIV 点滴注射 30mg/m ² フィルターを通さずに ドキシル注 20mg/10mL ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	30 mg /m ² 1 本	60分で	時間未定
4	DIV 点滴注射 ドキシル後にルートフラッシュ ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL	1 本	全開で	時間未定
5	DIV 点滴注射 AUC=5 カルボプラチン注「NK」 450mg/45mL/V 大塚生食注 250mL	5 mg /GFR+25 1 本	60分で	時間未定
6	DIV 点滴注射 10mg/kg ペハシスマブ ^三 BS点滴静注400mg/16mL/V第一	10 mg /kg 1 本	90分(初回)→60分(2回目)→30分(3回目以降)	時間未定
	大塚生食注 100mL	1 本		
7	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	1 本	全開で	時間未定

レジメンセット名 : ドキシル+CBDCA+BEV(Day15)

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV 点滴注射 ルートキープ用 ドキシル+CBDCA+BEV(Day15) 大塚生食注 50mL	1 本	15分で	時間未定
2	DIV 点滴注射 (初回90分)、2回目60分、3回目~30分 ペハシスマブ ^三 BS点滴静注400mg/16mL/V第一	10 mg /kg 1 本	(90分)→60分→30分	時間未定
	大塚生食注 100mL	1 本		
3	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	1 本	全開で	時間未定