

病名 : 卵巣癌

レジメンセット名 : Dose-dense TC(AUC=6)

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 6~9 コース

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV 点滴注射		15分	時間未定
	dose-dense TC(AUC=6) 15分で day1			
	グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイトリル)	1本		
	デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1V		
2	DIV 点滴注射		15分	時間未定
	15分で			
	ファモチジン注射用 20mg/A(前:カモファー)	1A		
	ボララミン注 5mg/1mL/A	1A		
	大塚生食注 50mL	1本		
3	DIV 点滴注射		1時間	時間未定
	80mg/m ²			
	ハウリタキセル注「ホスピール」 30mg/5mL/V(タキソール)	80 mg /m ²		
	ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本		
4	DIV 点滴注射		1時間	時間未定
	AUC=6			
	カルボプラチン注「NKJ」 450mg/45mL/V	6 mg /GFR+25		
	大塚生食注 250mL	1本		
5	DIV 点滴注射			時間未定
	ルートフラッシュ			
	大塚生食注 50mL	1本		
GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV 点滴注射		15分	時間未定
	dose-dense TC(AUC=6) 15分で day8,15			
	グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイトリル)	1本		
	デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1V		
2	IV 静脈内注射		15分	時間未定
	ファモチジン注射用 20mg/A(前:カモファー)	1A		
	ボララミン注 5mg/1mL/A	1A		
	大塚生食注 50mL	1本		
3	DIV 点滴注射		1時間	時間未定
	80mg/m ²			
	ハウリタキセル注「ホスピール」 30mg/5mL/V(タキソール)	80 mg /m ²		
	ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本		
4	DIV 点滴注射			時間未定
	ルートフラッシュ			
	大塚生食注 50mL	1本		