

病名 : 子宮頸がん 卵巣癌

レジメンセット名 : TC+アバスチン(AUC=6)

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 6 コース

アバスチンはPDまで

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV 点滴注射 【外来】TC+アバスチン療法(6) ①コース:21日 グラニセロン点滴静注パック 1mg/50mL(先: カイトリル) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1 本 3 V	15分	時間未定
2	DIV 点滴注射 ファモチジン注射用 20mg/A(前:カモファー) ボラミン注 5mg/1mL/A 大塚生食注 50mL	1 A 1 A 1 本	15分で	09:00
3	DIV 点滴注射 175mg/m ² ハクシキセル注「ホスピーラ」 30mg/5mL/V(3キソール) ブドウ糖液(テルモ糖注) 5% 500mL	175 mg /m ² 1 本	3時間で	時間未定
4	DIV 点滴注射 AUC=6 カルボプラチン注[NK] 450mg/45mL/V 大塚生食注 250mL	6 mg /GFR+25 1 本	1時間で	時間未定
5	DIV 点滴注射 15mg/kg アバスチン投与は術後28日目以降 アバスチン点滴静注用 400mg/16mL/V 大塚生食注 100mL 初回90分、2回目60分、3回目~30分	15 mg /kg 1 本	90分→60分→ 30分	時間未定
6	DIV 点滴注射 ルートフラッシュ 大塚生食注 50mL	1 本	全開で	時間未定