



病名 : 子宮頸がん

レジメンセット名 : TP+アバステン療法

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 6 コース

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
1	DIV 点滴注射 (アブリブキト含有)TP+アバステン療法 ソルアセトD輸液 500mL(先:ウイーンD)	1本	2時間で	時間未定		
2	DIV 点滴注射 側管より グラネセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイトリル) デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1本 1.5V	15分	時間未定		
3	DIV 点滴注射 側管より ファモチジン注射用 20mg/A(前:カモファー) ボララミン注 5mg/1mL/A 大塚生食注 50mL	1A 1A 1本	15分	時間未定		
4	DIV 点滴注射 パクリタキセル注「ホスピール」 30mg/5mL/V(タキソール) 180mg/m <sup>2</sup> ブドウ糖液(テルモ糖注) 5% 500mL	180 mg /m <sup>2</sup> 1本	30時間で	時間未定		
5	DIV 点滴注射 全量で500mLに調製 シスプラチン注「日医工」 10mg/20mL/V 75mg/m <sup>2</sup> テルモ生食注 500mL	75 mg /m <sup>2</sup> 1本	2時間で	時間未定		
6	IV 静脈内注射 ラシックス注 20mg/2mL/A	1A	シスプラチン開始 後iv.	時間未定		
7	DIV 点滴注射 初回90分、2回目60分、3回目~30分 アバステン点滴静注用 400mg/16mL/V 大塚生食注 100mL	15 mg /kg 1本	90分→60分→ 30分	時間未定		
8	DIV 点滴注射 30時間 ポタコールR輸液 500mL	1本	30時間で	時間未定		
9	DIV 点滴注射 30時間 ソルデム3A輸液 500mL(先:ソタT3)	1本	30時間で	時間未定		
10	DIV 点滴注射 翌朝まで持続		翌朝まで	時間未定		

11	DIV 点滴注射				時間未定	時間未定
	TP療法 Day2-3					
	ソルアセトD輸液 500mL(先:ウイーンD)	1本				
12	DIV 点滴注射				時間未定	時間未定
	側管より					
	デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトD)	1V				
	プリンペラン注射液 10mg/2mL/A	1A				
	大塚生食注 100mL	1本				
13	DIV 点滴注射				時間未定	時間未定
	アクチット輸液 500mL(パック)	1本				
14	DIV 点滴注射				時間未定	時間未定
	ソルアセトD輸液 500mL(先:ウイーンD)	1本				
15	DIV 点滴注射				時間未定	時間未定
	アクチット輸液 500mL(パック)	1本				
16	IV 静脈内注射				時間未定	
	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	1筒				
						
1					●	
	アブレタントカプセル125mg(先:イメンド)	1カプセル				
	抗がん剤投与前に内服					
						
1					●	→
	アブレタントカプセル80mg(先:イメンド)	1カプセル				
	1日1回 朝食後					